

RINITE DE DIFÍCIL CONTROLE?

A combinação entre montelucaste e levocetirizina **traz alívio** aos sintomas nasais, **aumentando a qualidade de vida** do paciente.¹

1X
Ao dia²
pacientes adultos



www.glenmark.com.br



CONTRAINDICAÇÃO: ALERGIA ÀS SUBSTÂNCIAS ATIVAS (MONTELUCASTE OU LEVOCETIRIZINA). INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: FENITOÍNA.

Levolutast (montelucaste de sódio + dicloridrato de levocetirizina). **FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:** apresenta-se em frascos contendo 7 ou 14 comprimidos revestidos. Cada comprimido de Levolutast contém 10,4 mg de montelucaste de sódio (equivalente a 10 mg de montelucaste) e 5mg de dicloridrato de levocetirizina. **USO ORAL. USO ADULTO. INDICAÇÕES:** Levolutast é indicado para o alívio dos sintomas associados à rinite alérgica sazonal. **CONTRAINDICAÇÕES:** Levolutast é contraindicado em: pacientes com conhecida hipersensibilidade ao montelucaste ou levocetirizina, a outros derivados de piperazina ou a qualquer um dos excipientes da fórmula; pacientes com insuficiência renal grave com menos de 10 ml/min de depuração da creatinina; pacientes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose, deficiência de lactase ou deficiência de absorção de glicose-galactose. **Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:** A ocorrência de sonolência, fadiga e astenia têm sido relatadas em alguns pacientes em tratamento com levocetirizina, portanto os pacientes devem ser advertidos para não exercerem ocupações perigosas que requerem agilidade mental completa e coordenação motora, como operar máquinas ou dirigir um veículo a motor após o uso de Levolutast. O Levolutast contém lactose em sua fórmula e pacientes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose, deficiência de lactase ou deficiência de absorção de glicose-galactose não devem tomar este medicamento. **Atenção: Este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser usado com cautela em portadores de diabetes. Não se sabe se Levolutast é excretado no leite humano, portanto deve-se ter cautela ao administrá-lo a nutrízes. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Deve-se ter cuidado ao administrar Levolutast concomitantemente com a substância ritonavir e com indutores do CYP 3A4, tais como fenitoína, fenobarbital e rifampicina. A interação de Levolutast com o álcool pode causar diminuição da habilidade e do estado de atenção. **REAÇÕES ADVERSAS:** As reações adversas ocasionadas pelo uso de Levolutast foram usualmente leves ou moderadas, com exceção de um evento adverso de sonolência, todos os outros eventos adversos foram considerados não relacionados ao uso da combinação de montelucaste e levocetirizina. As reações adversas comuns ao uso individual de montelucaste são: infecção do trato respiratório superior, diarreia, náusea, vômito, elevação de TGO e TGP, vermelhidão na pele e febre. As reações adversas comuns ao uso individual de levocetirizina são: dor de cabeça, boca seca, sonolência, cansaço. **POSOLOGIA:** Em pacientes adultos a dose recomendada é de um comprimido por via oral, à noite. Em pacientes com insuficiência hepática ou insuficiência renal leve (clearance de creatinina > 79 ml/min) não são necessários ajustes posológicos. Em pacientes com insuficiência renal moderada (clearance de creatinina < 79 ml/min) ou grave (clearance de creatinina > 10ml/min), este produto deve ser usado com cautela e sob rigorosa supervisão médica. Levolutast deve ser utilizado por 14 dias ou conforme recomendação médica. Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, com ou sem alimentos. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Registro MS: 1.1013.0274.**

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1) Ciebida, M et al. Quality of Life in Patients With Persistent Allergic Rhinitis Treated With Montelukast Alone or in Combination With Levocetirizine or Desloratadine. J Investig Allergol Clin Immunol. 2008; 18(5): 343-349 2) Levolutast [bula]. Baddi, Índia: Glenmark Pharmaceuticals Ltd. SP013913 - Março/2020

Levolutast é um medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicados.